

KWESTIONARIUSZ 1

Przed zastosowaniem leku Maxigra Go proszę sprawdzić czy występują u Pana zaburzenia erekcji. W tym celu proszę wypełnić poniższy kwestionariusz.

Spośród odpowiedzi na każde pytanie proszę wybrać tylko jedną – tę, która najlepiej określa Pańskie odczucie.

W ciągu ostatnich 4 tygodni:

Jak ocenia Pan swoją pewność, że mógłby Pan mieć i utrzymać wzwód prącia?		Bardzo nisko	Nisko	Umiarkowa- nie	Wysoko	Bardzo wysoko
	0	1	2	3	4	5
Jeśli wzwód prącia wystąpił w wyniku stymulacji seksualnej, jak często był nasilony na tyle że umożliwiał wprowadzenie prącia do pochwy partnerki?	Nie było aktywności seksualnej	Prawie nigdy lub nigdy	Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)	Czasami (mniej więcej co drugi raz)	Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)	Prawie zawsze lub zawsze
Jak często w czasie stosunku seksualnego był Pan w stanie utrzymać wzwód po wprowadzeniu prącia do pochwy partnerki?	Nie podejmowałem stosunków płciowych	Prawie nigdy lub nigdy	Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)	Czasami (mniej więcej co drugi raz)	Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)	Prawie zawsze lub zawsze
Jak trudno było Panu utrzymać wzwód prącia do zakończenia stosunku płciowego?	Nie podejmowałem stosunków płciowych	Niezwykle trudno	Bardzo trudno	Trudno	Nieznacznie trudno	Nie miałem trudności
Jeśli podejmował Pan stosunek seksualny, jak często dostarczył on Panu zadowolenia?	Nie podejmowałem stosunków płciowych	Prawie nigdy lub nigdy	Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz)	Czasami (mniej więcej co drugi raz)	Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz)	Prawie zawsze lub zawsze
WYNIK (SUMA PUNKTÓW)						

WYNIK	INTERPRETACJA WYNIKU	STOSOWANIE LEKU MAXIGRA GO
22-25	Brak zaburzeń erekcji	Nie ma potrzeby stosowania leku Maxigra Go.
17-21	Łagodne zaburzenia erekcji	Można stosować lek Maxigra Go.
12-16	Zaburzenia erekcji łagodne do umiarkowanych	
8-11	Umiarkowane zaburzenia erekcji	
1-7	Ciężkie zaburzenia erekcji (5-7, jeśli mężczyzna nie miał okazji do wykazywania aktywności seksualnej)	Wynik może świadczyć o ciężkich zaburzeniach erekcji. Należy zasięgnąć porady lekarza.