

Jak używać leku Momester Nasal?



Przygotowanie aerozolu do nosa do stosowania





Jeśli rozpoczynasz stosowanie nowego opakowania leku, przed podaniem należy dokładnie wstrząsnąć butelką, zdjąć nakładkę i nacisnąć pompkę 10 razy (do uzyskania jednolitego rozpylenia).



Jeśli rozpoczynasz stosowanie nowego opakowania leku, przed podaniem należy dokładnie wstrząsnąć butelką, zdjąć nakładkę i nacisnąć pompkę 10 razy (do uzyskania jednolitego rozpylenia).



Jeśli aerozol nie był stosowany przez 14 dni lub więcej, przed kolejnym
użyciem należy nacisnąć pompkę 2 razy, aż do uzyskania jednolitej mgiełki.

Prawidłowy sposób aplikacji leku



KROK 1

Przygotuj lek



Dokładnie wstrząsaj pojemnikiem przez **5-10 sekund**.

KROK 1

Przygotuj lek



Następnie usuń nakładkę.

KROK 2

Udrożnij nos



Aby lek zadziałał musi mieć kontakt z błoną śluzową nosa.

Oczyść nos, wydmuchując wydzielinę z obydwu otworów nosowych.

KROK 3

Umieść dozownik
w przedsionku nosa



Zrób to, pochylając głowę lekko do przodu, trzymając butelkę **pionowo do góry**. Unikaj zetknięcia dozownika z przegrodą nosa, kierując jego wylot lekko w bok, w kierunku wewnętrznego kącika oka.

KROK 3

Umieść dozownik
w przedsionku nosa



Zrób to, pochylając głowę lekko do przodu, trzymając butelkę **pionowo do góry**. Unikaj zetknięcia dozownika z przegrodą nosa, kierując jego wylot lekko w bok, w kierunku wewnętrznego kącika oka.

źle ❌



✅ dobrze



UWAGA!

Utrzymywanie butelki **w pozycji pionowej** jest bardzo ważne, ponieważ niewłaściwe rozpylenie może spowodować uszkodzenie przegrody nosowej.

KROK 4

Podaj zalecaną
liczbę dawek



Zamknij drugi otwór nosowy i naciśnij dozownik jeden raz,
by uwolnić lek, jednocześnie wykonując delikatny wdech,
by uniemożliwić wypłynięcie leku z jamy nosa.

KROK 4

Podaj zalecaną
liczbę dawek



Zamknij drugi otwór nosowy i naciśnij dozownik jeden raz, by uwolnić lek, jednocześnie wykonując delikatny wdech, by uniemożliwić wypłynięcie leku z jamy nosa.

KROK 4

Podaj zalecaną
liczbę dawek



Po wyjęciu końcówki dozownika z otworu nosowego zrób **wydech przez usta**.
Następnie, jeżeli jest taka potrzeba, powtórz czynność, aby podać drugą dawkę
aerozolu do tego samego otworu nosowego (powtórz od punktu 3).

KROK 5

Zaaplikuj lek
do drugiego
otworu nosowego



Powtórz czynności z kroku 2, 3 i 4,
aby podać aerozol do drugiego otworu nosowego.

KROK 6

Oczyść i zabezpiecz
aplikator



Po użyciu aerozolu ostrożnie wytrzyj końcówkę dozownika
czystą chusteczką lub ściereczką.

KROK 6

Oczyść i zabezpiecz
aplikator



Założ nasadkę, aby zapobiec dostawaniu się kurzu.

