



SPM1117-R00

KARTA OSTRZEŻEŃ DLA PACJENTA

Prabixan®
Dabigatranum etexilatatum

- Ta karta powinna być zawsze przy Tobie / opiece
- Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji

Drogi Pacjencie / Opiekunie pacjenta pediatrycznego

Lekarz Twój / Twojego dziecka rozpoczął leczenie lekiem Prabixan. W celu bezpiecznego stosowania leku Prabixan należy zapoznać się z ważnymi informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania. Ponieważ niniejsza karta ostrzeżeń dla pacjenta zawiera ważne informacje na temat leczenia Twojego / Twojego dziecka, kartę tę należy zawsze mieć przy sobie / dziecku, aby informować pracowników służby zdrowia o przyjmowaniu przez Ciebie / Twoje dziecko leku Prabixan.

Prabixan - Informacje dla pacjentów / opiekunów pacjentów pediatrycznych

- O leczeniu Twoim / Twojego dziecka
- Prabixan rozrzedza krew. Stosowany jest w leczeniu istniejących zakrzepów krwi lub zapobieganiu tworzeniu się niebezpiecznych zakrzepów krwi.
 - Podczas stosowania leku Prabixan należy postępować zgodnie z instrukcjami lekarza swojego dziecka. Nigdy nie należy pomijać dawki ani przerywać stosowania leku Prabixan bez konsultacji z lekarzem prowadzącym/dziecko.
 - Poinformuj lekarza prowadzącego / dziecka o wszystkich lekach, które Ty / Twoje dziecko obecnie zażywasz.
 - Należy poinformować lekarza prowadzącego / swojego dziecka o przyjmowaniu leku Prabixan przed jakimkolwiek zabiegiem chirurgicznym/irwazyjnym.
 - Kapsułki Prabixan można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Kapsułki nie wolno łamać ani żuć, a granulek nie wolno wysypywać z kapsułki.

Kiedy zwrócić się o poradę lekarską

- Przyjmowanie leku Prabixan może zwiększać ryzyko krwawienia. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem dziecka, jeśli u pacjenta/dziecka wystąpią oznaki i objawy krwawienia, takie jak: obrzęk, dyskomfort, nietypowy ból lub ból głowy, zawroty głowy, bladeść, osłabienie, nietypowe siniaki, krwawienia z nosa, krwawienie z dziąseł, nietypowe długie krwawiące skaleczenia, nieprawidłowe miesiączki lub krwawienie z pochwy, krew w moczu, która może być różowa lub brązowa, czerwone/czarne stolce, odkrztuszanie krwi, wymioty krwią lub materiałem przypominającym zmieloną kawę
- W przypadku upadku lub urazu, szczególnie w przypadku uderzenia w głowę, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.
- Nie należy przerywać stosowania leku Prabixan bez konsultacji z lekarzem prowadzącym dziecko, jeśli u pacjenta lub dziecka wystąpi zgaga, nudności, wymioty, dyskomfort w żołądku, wzdęcia lub ból w górnej części brzucha.

Prabixan - Informacje dla pracowników służby zdrowia

Prabixan jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym (bezpośrednim inhibitorem trombiny). Może zaistnieć konieczność przerwania stosowania leku Prabixan przed zabiegami chirurgicznymi lub innymi inwazyjnymi zabiegami.

W przypadku wystąpienia poważnych krwawień należy natychmiast przerwać stosowanie leku Prabixan. Dla dorosłych pacjentów dostępny jest specyficzny środek odwracający działanie (idarucyzumab). Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa specyficznego środka odwracającego działanie idarucyzumabu u dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje i dalsze porady dotyczące antagonizowania działania przeciwzakrzepowego leku Prabixan znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego Prabixan i idarucyzumabu. Prabixan jest wydalany głównie przez nerki; należy utrzymać odpowiednią diurezę. Prabixan podlega dializie.

Proszę wypełnić tę część lub poprosić o to lekarza swojego dziecka.

Informacja o pacjencie

Imię i nazwisko pacjenta

Data urodzenia

Wskazania do leczenia przeciwzakrzepowego

Dawka leku Prabixan

wersja 1.0/PL/PPH/03.2025
data zatwierdzenia: 22.07.2025

PUD-023003_1