



## Broszura dla pacjenta

**Przeczytaj broszurę i zapoznaj się z ulotką przed rozpoczęciem stosowania leku. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**

Ten lek zawiera metamizol. Aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych, stosuj go zgodnie z zaleceniami.

### **Jak prawidłowo stosować lek?**

Nie stosuj leku dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się - skontaktuj się z lekarzem.

### **Co powinieneś wiedzieć?**

Metamizol może powodować agranulocytozę, czyli znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek. Jest to rzadkie, ale poważne działanie niepożądane, które może prowadzić do ciężkich i zagrażających życiu zakażeń.

Agranulocytoza może wystąpić w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu - także u osób, które wcześniej stosowały metamizol bez powikłań.

### **Objawy alarmowe sugerujące agranulocytozę:**

- gorączka, dreszcze
- ból gardła
- bolesne owrzodzenia nosa, jamy ustnej, gardła, okolicy narządów płciowych lub odbytu.

### **Co zrobić w przypadku objawów alarmowych?**

Natychmiast przerwij stosowanie leku i skontaktuj się z lekarzem.

**Uwaga:** Jeśli przyjmujesz metamizol z powodu gorączki, możesz trudniej zauważyć, że jest to objaw agranulocytozy. Może być on także maskowany podczas stosowania metamizolu równocześnie z antybiotykami.

**Gdzie szukać informacji:** Szczegółowe informacje (dawkowanie, interakcje, przeciwwskazania) znajdują się w ulotce.

**Pamiętaj!** Zachowaj broszurę, aby w razie potrzeby móc szybko sprawdzić, jak postępować.